



**Kath. Kliniken OM gGmbH - St. Josefs-Hospital,
Krankenhausstraße 13, 49661 Cloppenburg**

Ihre WDC-Klinik-ID: **45**

Koordinator Darmzentrum: **PD Dr. med. J. Bäsecke**

Ansprechpartner WDC-Benchmarking: **Dr. med. F. Hammersen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das abgelaufene Jahr erhielten wir aus Ihrem Hause wiederum hervorragende Tumordokumentationen, die eine vollständige Abbildung Ihrer sehr guten Behandlungsqualität erlauben.

Die Ergebnisse zeigen ein sehr hohes Maß an Leitlinien-treue sowie eine umfassende und sichere Behandlung Ihrer Patienten an.

Bitte ergänzen Sie die sehr guten Dokumentationen noch um die Resultate der therapeutischen Koloskopie für den Indikator 02.

Weitere signifikante Abweichungen der formulierten Qualitätsziele können nicht beschrieben werden.


Primär-Diagnosen:	49	Primär-Operationen:	47
Kolonkarzinome:	34	Kolonkarzinome:	32
Rektumkarzinome:	15	Rektumkarzinome:	15
Übergangskarzinome:	0	Übergangskarzinome:	0
<hr/>			
Durchschnittsalter Ihrer Klinik:	67	ASA-Durchschnitt Ihrer Klinik:	2,7
Durchschnittsalter aller Kliniken:	72	ASA-Durchschnitt aller Kliniken:	2,6
<hr/>			
Anteil der Patienten in Studien:	0 %		




Primäre Stadienverteilung

Anteilige Darstellung der UICC-Stadien 0 bis IV

Kolonkarzinom



Rektumkarzinom



QUALITÄTSINDIKATOREN

1 Anteil totaler Koloskopien

Vollständige Koloskopien	35
Unvollständige Koloskopien wegen einer Stenose	4
Alle Koloskopien ohne Stenose	38
Ihr Ergebnis	92 %
Wert über alle Einrichtungen	96 %

2 Anteil Polypektomien bei Erstkoloskopie

Polypektomien	1
Polyp im späteren Resektionsareal	4
Anzahl Koloskopien mit Polypennachweis	15
Ihr Ergebnis	9 %
Wert über alle Einrichtungen	95 %

3 Anteil Operationen mit entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten ≥ 12

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	40
Grundgesamtheit	42
Ihr Ergebnis	93 %
Wert über alle Einrichtungen	93 %

3a Anteil Operationen mit entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten ≥ 12 bei nicht vorbehandelten Patienten

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	37
Grundgesamtheit	39
Ihr Ergebnis	95 %
Wert über alle Einrichtungen	95 %

3b Anteil Operationen mit entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten ≥ 12 bei onkologisch vorbehandelten Patienten

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	3
Grundgesamtheit	3
Ihr Ergebnis	100 %
Wert über alle Einrichtungen	81 %



4 Anteil Revisionsoperationen bei kolorektalen Karzinomen (elektiv)

Anzahl Revisionen (nach elektiv OP)	1
Anzahl Notfälle	2
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	45
Ihr Ergebnis	2,2 %
Wert über alle Einrichtungen	7,4 %

4a Anteil Revisionsoperationen bei Kolonkarzinomen (elektiv)

Anzahl Revisionen (nach elektiv OP)	1
Anzahl Notfälle	2
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	30
Ihr Ergebnis	3,3 %
Wert über alle Einrichtungen	7,5 %

4b Anteil Revisionsoperationen bei Rektumkarzinomen (elektiv)

Anzahl Revisionen (nach elektiv OP)	0
Anzahl Notfälle	0
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	15
Ihr Ergebnis	0 %
Wert über alle Einrichtungen	7,4 %

5 Anteil der protektiven Stomata bei elektiven Kolonkarzinomeingriffen

Fälle mit protektiven Stomata	0
Anzahl Notfälle	2
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	30
Ihr Ergebnis	0 %
Wert über alle Einrichtungen	2,8 %

6 Anteil der pathohistologischen lokalen R0-Resektionen

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	44
Grundgesamtheit	47
Ihr Ergebnis	94 %
Wert über alle Einrichtungen	95 %

6a Anteil der pathohistologischen lokalen R0-Kolon-Resektionen

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	31
Grundgesamtheit	32
Ihr Ergebnis	97 %
Wert über alle Einrichtungen	96 %

6b Anteil der pathohistologischen lokalen R0-Rektum-Resektionen

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	13
Grundgesamtheit	15
Ihr Ergebnis	87 %
Wert über alle Einrichtungen	93 %



7 Anteil der Anastomosen-Insuffizienzen nach elektiver Kolonkarzinom-OP als Revisionsoperation

Fälle mit Anastomosen-Insuffizienz	1
Anzahl Notfälle	2
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	30
Ihr Ergebnis	3,3 %
Wert über alle Einrichtungen	4,3 %

8 Anteil der Anastomosen-Insuffizienzen nach Rektumkarzinom-OP und neoadjuvanter Radiochemotherapie als Revisionsoperation

Fälle mit Anastomosen-Insuffizienz	0
Anzahl Notfälle	0
Grundgesamtheit (elektiv)	4
Ihr Ergebnis	0 %
Wert über alle Einrichtungen	3,2 %

9 Dokumentation des circumferentiellen Randes des Rektum-Ca nach TME / PME

Anzahl „CRM“ komplett	10
Anzahl Fälle m. Mesorektumexstirpation	11
Ihr Ergebnis	91 %
Wert über alle Einrichtungen	85 %

10 Anteil vollständiger postoperativer Angaben der kompletten Histologie entsprechend ICD-O-3

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	43
Grundgesamtheit	45
Ihr Ergebnis	96 %
Wert über alle Einrichtungen	93 %

10a Anteil vollständiger postoperativer Angaben der kompletten Histologie entsprechend ICD-O-3 ohne lokale Verfahren

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	38
Grundgesamtheit	40
Ihr Ergebnis	95 %
Wert über alle Einrichtungen	95 %

10b Anteil vollständiger postoperativer Angaben der kompletten Histologie entsprechend ICD-O-3 lokaler Verfahren ohne N-Status

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	5
Grundgesamtheit	5
Ihr Ergebnis	100 %
Wert über alle Einrichtungen	91 %

11 Die Qualität der Mesorektumexstirpation (sogenannter M.E.R.C.U.R.Y.-Grad)

Anzahl TME / PME	11
Grad 1 (good)	5 \triangleq 45 %
Grad 2 (moderate)	2 \triangleq 18 %
Grad 3 (poor)	0 \triangleq 0 %
unbekannt	4 \triangleq 36 %

12 Adjuvante Therapie beim Kolonkarzinom: Anteil Patienten, die im Stadium III adjuvant behandelt werden

Anzahl intern/extern durchgeführt	7 / 0
Ablehnung, Kontraindikation etc.	1
Anzahl Fälle indiziert	7
Ihr Ergebnis	100 %
Wert über alle Einrichtungen	81 %



13 Anteil perioperativer Therapien beim Rektumkarzinom im Stadium II / III im unteren und mittleren Rektumdrittel (≤ 12cm anocutan)

Anzahl intern und extern behandelt	3
Ablehnung, Kontraindikation etc.	0
Anzahl Fälle indiziert	4
Ihr Ergebnis	75 %
Wert über alle Einrichtungen	78 %

13 Anteil perioperativer Therapien beim alt Rektumkarzinom im Stadium II / III

Anzahl intern und extern behandelt	4
Ablehnung, Kontraindikation etc.	1
Anzahl Fälle indiziert	5
Ihr Ergebnis	80 %
Wert über alle Einrichtungen	65 %

14 Anteil metastasierter Patienten mit palliativer Chemotherapie

Anzahl intern/extern durchgeführt	5 / 0
Ablehnung, Kontraindikation etc.	2
Anzahl Fälle indiziert	5
Ihr Ergebnis	100 %
Wert über alle Einrichtungen	82 %

14a Anteil der sekundären Leberresektion nach Chemotherapie bei UICC-Stadium IV / hep.

Anzahl sek. Metastasenresektionen	0
Anzahl Fälle metastasiert / hep.	4
Ihr Ergebnis	0 %
Wert über alle Einrichtungen	1,5 %

15 Anteil CEA-Bestimmung vor Elektiv-OP eines KRK

Fälle mit erfüllten Qualitätskriterien	42
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	45
Ihr Ergebnis	93 %
Wert über alle Einrichtungen	91 %

16 30-Tage-Letalität nach elektiven operativen Eingriffen

Fälle verstorben	0
Anzahl Notfälle	2
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	45
Ihr Ergebnis	0 %
Wert über alle Einrichtungen	3,3 %

16a 30-Tage-Letalität nach elektiven operativen Eingriffen bei Kolonkarzinomen

Fälle verstorben	0
Anzahl Notfälle	2
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	30
Ihr Ergebnis	0 %
Wert über alle Einrichtungen	3,9 %

16b 30-Tage-Letalität nach elektiven operativen Eingriffen bei Rektumkarzinomen

Fälle verstorben	0
Anzahl Notfälle	0
Anzahl Primäroperationen (elektiv)	15
Ihr Ergebnis	0 %
Wert über alle Einrichtungen	2,5 %



Ergebnisbericht zum WDC-Benchmarking
Gesamtjahr 2012



Nachsorgequote 2009

Primärfälle 2009	45
Patienten mit Nachsorge im Betrachtungszeitraum	22
Ihr Ergebnis	67 %
Wert über alle Einrichtungen	27 %

Nachsorgequote 2010

Primärfälle 2010	44
Patienten mit Nachsorge im Betrachtungszeitraum	26
Ihr Ergebnis	74 %
Wert über alle Einrichtungen	33 %

Nachsorgequote 2011

Primärfälle 2011	33
Patienten mit Nachsorge im Betrachtungszeitraum	23
Ihr Ergebnis	77 %
Wert über alle Einrichtungen	46 %

Mit der folgenden Grafik unserer Indikatoren geben wir Ihnen eine Auswertung der medizinischen Qualitätssicherung auf einen Blick mit an die Hand. Einrichtungen mit einem besseren Resultat sind **hellblau**, mit gleichem **dunkelblau** und mit schlechterem Resultat **blau** dargestellt.

